# Predikovaný vývoj poměru přínosů a nákladů (BCR) - očkovací program proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV)

data o zdraví




**Základní linie**

Základní scénář vychází ze skutečného průběhu šíření viru podle odhadů SZÚ.

**Zahájení sezóny RSV: Brzy**

Brzký výskyt znamená, že virus se nejvíce vyskytuje v období říjen až prosinec. Pokud očkování začne v říjnu, v tomto případě budou chráněny pouze děti ve věku 2 měsíců a méně.

**Zahájení sezóny RSV: Pozdě**

Pozdní scénář předpokládá, že virus se nejvíce vyskytuje v období leden až duben. V tomto případě, za předpokladu, že očkování začne v říjnu, budou chráněny i některé děti ve věku 4–6 měsíců.

**Zahájení sezóny RSV: Dec-skew**

Tento scénář ukazuje, že aktivita viru RSV vrcholí převážně v prosinci. Pokud očkování zahájíme v říjnu, ochranu získají pouze děti ve věku 0–3 měsíce, zatímco děti ve věku 4–6 měsíců už ne.

Verze → 2025-08

Zdroj dat → viz publikovaný výstup, sekce Metodologie a reference

Licence → CC B Y 4.0